



INDAGINE MULTISCOPO ISTAT
“CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI”
Anno 2005
Alcune prime elaborazioni

Per una valutazione globale delle condizioni di salute, la percezione dello stato di salute rappresenta un importante riferimento in quanto consente di cogliere la multidimensionalità del concetto di salute, inteso, secondo la definizione dell'OMS, come stato di "completo benessere fisico, mentale e sociale".

Persone di 14 anni e più e persone di 65 anni e più per stato di salute dichiarato per sesso, Emilia-Romagna, anno 2005

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Male/molto male						tassi standardizzati
	Persone di 14 anni e più			Persone di 65 anni e più			
			MASCHI E			MASCHI E	
	MASCHI	FEMMINE	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	FEMMINE	
Emilia-Romagna	4,5	8,0	6,3	11,9	21,1	17,2	5,6
Italia Nord-Est	4,0	7,0	5,6	11,8	19,8	16,5	5,3
ITALIA	5,1	8,3	6,7	15,9	23,6	20,3	6,7

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Bene/molto bene						tassi standardizzati
	Persone di 14 anni e più			Persone di 65 anni e più			
			MASCHI E			MASCHI E	
	MASCHI	FEMMINE	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	FEMMINE	
Emilia-Romagna	66,0	53,1	59,3	32,6	21,1	25,9	61,6
Italia Nord-Est	67,0	56,1	61,4	32,8	23,7	27,5	62,4
ITALIA	66,7	56,3	61,3	28,0	19,5	23,1	61,3

All'aumentare dell'età peggiorano le condizioni di salute dichiarate. Differenze di genere si riscontrano in tutte le classi d'età; tuttavia lo **svantaggio femminile diventa più evidente al crescere dell'età**. Ciò è spiegato anche dal fatto che tra le donne sono più diffuse le **patologie croniche** di tipo invalidante.

Uno strumento sintetico ampiamente utilizzato che concorre a definire la salute percepita e la qualità della vita è la **batteria di quesiti dell'SF12**, che consente di costruire due **indici di salute percepita**: uno sullo **stato fisico** e l'altro **sullo stato psicologico**. I punteggi medi di tali indici sono da confrontare in termini relativi: all'aumentare del punteggio medio migliora la valutazione delle condizioni di salute e anche differenze di 0,5 punti sono da segnalarsi come significative.

*Persone di 14 anni e più e persone di 65 anni e più secondo l'indice di stato **fisico e psicologico** per sesso, Emilia Romagna. Anno 2005*


REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Indice di stato fisico						tassi standardizzati
	Persone di 14 anni e più			Persone di 65 anni e più			
			MASCHI E			MASCHI E	
	MASCHI	FEMMINE	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	FEMMINE	
Emilia-Romagna	51,4	48,9	50,1	45,5	40,8	42,7	50,6
Italia Nord- Orientale	51,4	49,3	50,3	44,9	41,0	42,6	50,5
ITALIA	51,5	49,3	50,4	44,1	40,4	42,0	50,4

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Indice di stato psicologico						tassi standardizzati
	Persone di 14 anni e più			Persone di 65 anni e più			
			MASCHI E			MASCHI E	
	MASCHI	FEMMINE	FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	FEMMINE	
Emilia-Romagna	50,8	47,8	49,3	49,3	45,6	47,2	49,4
Italia Nord- Orientale	51,0	48,4	49,7	49,3	46,2	47,5	49,7
ITALIA	51,2	48,5	49,8	48,5	45,3	46,6	49,8



Malattie croniche

Popolazione e persone di 65 anni e più per presenza di malattie croniche dichiarate e sesso. Emilia-Romagna, anno 2005




Disabilità

La presenza di **disabilità** può condizionare in modo rilevante la qualità della vita, limitando in misura più o meno grave l'autonomia della persona. Una persona è definita "**disabile**" se presenta gravi difficoltà in almeno una delle seguenti dimensioni: confinamento a letto, su una sedia o in casa; difficoltà di movimento, difficoltà nelle funzioni quotidiane, difficoltà nella comunicazione (vista udito e parola). Nel rilevare il fenomeno della disabilità l'Istat ha fatto sempre riferimento al **questionario predisposto negli anni '80** da un gruppo di lavoro dell'OCSE sulla base della classificazione OMS.

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Persone con disabilità							tassi standardizzati
	Persone di 6 anni e più			Persone di 65 anni e più				
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E		
			FEMMINE			FEMMINE		
Emilia-Romagna	2,9	5,8	4,4	10,3	20,0	15,9	3,8	
Italia Nord-Orientale	2,9	5,4	4,2	11,8	19,5	16,3	4,0	
ITALIA	3,3	6,1	4,8	13,3	22,5	18,7	4,8	


Uso di farmaci

Popolazione e persone di 65 anni e più che hanno consumato farmaci nelle 2 settimane prec. l'intervista e che consumano farmaci quotidianamente per sesso. Emilia-Romagna, anno 2005






Persone che consumano quotidianamente farmaci per regione, anno 2005



REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Persone che hanno fatto il vaccino antinfluenzale							tassi standardizzati
	Popolazione			Persone di 65 anni e più				
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E FEMMINE		
Piemonte	17,1	21,2	19,2	55,5	58,6	57,3	17,6	
Valle d'Aosta	13,3	17,7	15,5	54,9	57,2	56,3	15,2	
Lombardia	18,0	20,8	19,4	60,5	59,2	59,7	19,5	
Trentino-Alto Adige	10,8	14,8	12,8	45,2	52,5	49,5	13,9	
- <i>Bolzano-Bozen</i>	8,4	12,4	10,4	38,0	49,0	44,4	11,9	
- <i>Trento</i>	13,2	17,0	15,2	51,6	55,4	53,8	15,8	
Veneto	18,7	22,7	20,8	66,9	67,9	67,5	21,1	
Friuli-Venezia Giulia	19,4	23,8	21,7	66,9	69,3	68,3	19,5	
Liguria	22,7	27,8	25,4	60,6	62,2	61,6	21,4	
Emilia-Romagna	22,3	24,9	23,6	66,0	65,7	65,8	21,5	
Toscana	21,1	23,5	22,3	61,0	60,8	60,8	20,0	
Umbria	19,8	21,9	20,9	61,8	59,9	60,7	18,4	
Marche	19,5	21,6	20,6	66,2	62,4	64,1	18,7	
Lazio	19,4	19,7	19,5	65,3	60,8	62,7	20,0	
Abruzzo	19,8	23,4	21,6	61,2	69,9	66,2	20,6	
Molise	21,6	24,0	22,9	68,8	67,4	68,0	21,6	
Campania	19,1	21,0	20,1	68,1	70,1	69,3	23,0	
Puglia	19,3	22,7	21,0	64,1	68,0	66,3	22,6	
Basilicata	17,2	20,1	18,6	59,4	65,7	63,0	18,9	
Calabria	17,4	19,6	18,5	61,3	62,1	61,7	19,7	
Sicilia	17,5	19,5	18,5	57,0	59,5	58,4	19,8	
Sardegna	15,7	17,8	16,8	54,1	56,6	55,5	18,0	
Italia Nord-Occidentale	18,2	21,6	19,9	59,0	59,4	59,2	19,2	
Italia Nord-Orientale	19,5	22,9	21,2	64,9	66,0	65,6	20,4	
Italia Centrale	20,0	21,3	20,7	63,6	60,9	62,1	19,7	
Italia Meridionale	19,0	21,5	20,3	64,7	68,0	66,6	22,0	
Italia Insulare	17,0	19,1	18,1	56,3	58,8	57,7	19,4	
ITALIA	18,8	21,5	20,2	62,0	62,8	62,5	20,2	

Persone di 65 anni e oltre che, nei dodici mesi precedenti l'intervista hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale per regione, anno 2005




fattori di rischio per la salute

*Persone di 18 anni e più e persone di 65 anni e più, **obesi** per sesso, Emilia-Romagna, anno 2005*

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Persone obese							tassi standardizzati	
	Persone di 18 anni e +			Persone di 65 anni e più					
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E			
			FEMMINE			FEMMINE			
<i>Emilia-Romagna</i>	<i>11,2</i>	<i>10,0</i>	<i>10,6</i>	<i>15,4</i>	<i>13,5</i>	<i>14,3</i>	<i>10,3</i>		
Italia Nord- Orientale	10,7	8,9	9,8	14,7	13,0	13,7	9,6		
ITALIA	10,5	9,1	9,8	13,6	14,0	13,8	9,8		

*Persone di 18 anni e oltre **obesi** per regione, anno 2005*



*Persone di 14 anni e più secondo l'abitudine **al fumo** per sesso, regione e ripartizione geografica. – Anno 2005*

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Fumatori			tassi standardizzati
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E FEMMINE	
Piemonte	27,3	16,6	21,8	22,2
Valle d'Aosta	27,4	17,2	22,2	22,1
Lombardia	27,0	17,5	22,1	21,9
Trentino-Alto Adige	24,1	17,5	20,7	20,4
- <i>Bolzano-Bozen</i>	23,6	17,7	20,6	20,0
- <i>Trento</i>	24,5	17,3	20,8	20,7
Veneto	24,2	15,3	19,7	19,5
Friuli-Venezia Giulia	23,8	17,9	20,7	21,3
Liguria	26,4	17,9	21,9	23,1
Emilia-Romagna	27,0	19,5	23,1	23,7
Toscana	26,6	18,9	22,6	23,3
Umbria	27,8	19,7	23,6	24,4
Marche	28,3	18,6	23,3	23,9
Lazio	31,2	18,0	24,2	24,0
Abruzzo	29,3	14,6	21,7	22,0
Molise	26,4	11,5	18,7	19,2
Campania	29,9	14,7	22,0	21,8
Puglia	28,4	10,0	18,8	18,6
Basilicata	29,1	12,6	20,6	20,7
Calabria	27,2	11,4	19,0	19,1
Sicilia	27,3	15,0	20,9	21,0
Sardegna	27,2	16,8	21,8	21,2
Italia Nord-Occidentale	27,0	17,3	22,0	22,1
Italia Nord-Orientale	25,2	17,4	21,2	21,4
Italia Centrale	29,0	18,5	23,5	23,8
Italia Meridionale	28,9	12,7	20,5	20,4
Italia Insulare	27,3	15,5	21,2	21,0
ITALIA	27,5	16,3	21,7	21,7

Ricoveri

Rispetto a 5 anni prima sono in **diminuzione** le persone che si ricoverano (-17,2%) e il numero di ricoveri (-18,7%), a livello nazionale

Ricoveri nei 3 mesi precedenti l'intervista, per sesso, Emilia-Romagna. - Anno 2005

REGIONI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Ricoveri							tassi standardizzati
	Popolazione			Persone di 65 anni e più				
	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E FEMMINE	MASCHI	FEMMINE	MASCHI E FEMMINE		
Emilia-Romagna	4,1	3,9	4,0	8,5	6,8	7,5	3,8	
Italia Nord- orientale	3,7	4,1	3,9	9,5	7,7	8,5	3,8	
ITALIA	3,7	3,9	3,8	9,2	7,3	8,1	3,8	



NOTA: Questi sono solo alcuni dati aggregati, non appena avremo i dati elementari potremo costruire vari indicatori ed incrociare le variabili, in primo luogo per fasce d'età, per misurare l'andamento dei fenomeni anche per i grandi anziani (80 anni e +). Si potrà ragionevolmente incrociare la disabilità con lo stato di salute, con le malattie croniche e la multicronicità piuttosto che con il consumo di farmaci, le visite e gli accertamenti effettuati. Le variabili potranno essere ulteriormente disaggregate per titolo di studio e professione per determinare lo status sociale individuale.

A livello nazionale, da questi dati emergono alcune differenze di genere, territoriali, e sociali sia nelle condizioni di salute che nel ricorso ai servizi sanitari. Nel sud ci sono più multicronici, più disabili, più persone con malattie croniche gravi. Le persone di status sociale più basso sono anche quelle che stanno peggio in salute. L'obesità, anche se ancora resta a livelli tra i più bassi in Europa, è in crescita. Anche in questo caso è più diffusa nel Mezzogiorno e tra gli strati sociali più bassi. Per quanto riguarda l'uso dei servizi sanitari, al Centro Nord c'è un maggior utilizzo di presidi a più elevata tecnologia, mentre al Sud emerge un maggior utilizzo di visite generiche e accertamenti di laboratorio.